

新型コロナワクチン

オミクロン株に 対応した 2価ワクチン接種のご検討を

従来型ワクチンを
上回る発症予防・
感染予防の効果が
期待されています。

接種対象者

初回(1・2回目)接種を
完了した12歳以上のすべ
ての方が対象で、ひとり
1回の接種ができます。

年内接種を!

1・2回目のワクチン接種がまだの方も引き続き接種ができますので、ぜひワクチン接種をご検討ください。
インフルエンザワクチンの同時接種も可能です。こちらもご検討ください。

相談してください!

ワクチンの副反応などに関する相談
北海道ワクチン接種相談センター

TEL.0120-306-154 (FAX.011-799-0338)

(受付時間) 9:00~17:30(平日、土日・祝日)

※接種の会場や日程等については、各町村にご確認ください。

ノババックスも扱っています!

北海道新型コロナワクチン予約センター
(ホテルエミシア札幌会場分)

TEL.050-3851-0181 (10時~18時)

●Webでも受付中 北海道ワクチン接種センター

検索

接種に当たっては、感染予防・重症化予防等のメリットと副反応等のデメリット双方について、
理解をしていただいた上で、ご自身の意思で接種をご検討ください。
ワクチン接種は強制ではなく、接種を受けていない方に対する不当な差別・偏見はあってはならないものです。

ワクチンに関する情報等については、以下のホームページ等からご覧になれます

北海道 北海道新型コロナウイルス
感染症対策本部
(ワクチン班)
一般社団法人 北海道医師会

北海道庁
ホームページ



北海道庁
Twitter



厚生労働省
ホームページ



ワクチンを接種しても、基本的な感染対策は必要です。

引き続き、三密回避・マスク着用・手洗い・手指消毒等、新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。

冬休みに向けて
ご検討を!

新 型 コ ロ ナ ウ ク チ ン

オミクロン株対応の 2価ワクチン接種

従来型を上回る
予防効果が期待
されているんだね!



接種
対象者

初回(1・2回目)接種を完了した12歳以上の
すべての方が対象で、ひとり1回の接種ができます。

年内
接種を!

1・2回目のワクチン接種がまだの方も
引き続き接種ができますので、ぜひワクチン接種をご検討ください。
インフルエンザワクチンの同時接種も可能です。こちらもご検討を!



北海道

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部

相談してください!

ワクチンの疑問点などに関する相談
北海道ワクチン接種
相談センター

TEL. **0120-306-154**
(FAX 011-799-0338)

受付時間 9:00~17:00(平日・土日祝)

* 各県のホームページについて、お問い合わせは、各県庁までお願いします。

ノバパックも扱っています!

北海道新型コロナワクチン
予約センター
(オプティエスシア札幌店内)

TEL. **050-3851-0181**

受付時間 10:00~18:00(平日・土日祝)

Web受付 北海道ワクチン接種センター



ご利用ください!

札幌市新型コロナウイルス
ワクチン接種予約センター
(オプティエスシア札幌店内)

TEL. **050-3684-9238**

受付時間 9:00~18:00(平日・土日祝)

Web受付 札幌ワクチンナビ



ワクチン接種を受ける・受けないは個人の自由です。ワクチン接種による差別や
不当な扱いが無いよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

ワクチンを接種しても、基本的な感染対策は必要です。
引き続き、三密回避・マスク着用・手洗い・手指消毒、
新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。

初回接種(1・2回目接種)がまだお済みでない方へ



**1・2回目
は年内に**

**年内に1・2回目接種を
完了することを
ご検討ください。**



現時点での情報

1

**1・2回目接種に使用している従来型ワクチン(※)は、
年内で、国からの供給を終了する予定です。**

初回接種またはオミクロン株に対応した2価のワクチン(オミクロン株対応2価ワクチン)での追加接種をご希望の方は、なるべくお早めに受けてください。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

(※) 従来型ワクチンを使用します。詳しくは、2ページ目のQ1をご覧ください。

2

**オミクロン株対応2価ワクチンは、
1・2回目接種が完了しないと接種できません。**

本年9月20日よりオミクロン株対応2価ワクチンによる接種を開始しています。オミクロン株対応2価ワクチンは、1・2回目接種を完了した12歳以上の方が対象で、1人1回接種します。

このワクチンはオミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されています。

オミクロン株対応2価ワクチンは、追加接種として臨床試験を実施し、有効性・安全性が確認されているため、従来型ワクチンによる1・2回目接種を完了している方が対象です。

(注) 接種間隔の短縮等について検討し、10月下旬までに結論を得る予定です。


3

**年末年始の新型コロナの流行に備えましょう。
計画的なワクチン接種をご検討ください。**

これまで2年間、年末年始の後に新型コロナは流行しています。

流行に備えて、重症化リスクの高い高齢者等とはもとより、若い方にもオミクロン株対応2価ワクチンによる接種をおすすめしています。

■日本国内の新規感染者数(1日ごと)



出典: 厚生労働省ホームページ「国内の感染状況」をもとに作成

よくあるご質問

Q1. 新型コロナワクチンの初回接種(1・2回目接種)にはどのようなワクチンが使用できますか。

A. 1・2回目接種には、従来型ワクチンを使用します。

従来型ワクチンとは、新型コロナの従来株に対応した1価ワクチンのことで、ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン、武田社ワクチン(ノババックス)のいずれかになります。

Q2. オミクロン株対応2価ワクチンは、初回接種(1・2回目接種)では使用できないのですか。

A. オミクロン株対応2価ワクチンは、追加接種として臨床試験を実施し、有効性・安全性が確認されているため、現時点においては、1・2回目接種としては、使用できません。

オミクロン株対応2価ワクチンを接種するためには、まず従来型ワクチンによる1・2回目接種を完了してください。

Q3. 1・2回目接種用の接種券が古かったり、なくなったりした場合でも受けることができますか。

A. 受けられます。お住まいの市町村から以前送付された1・2回目接種用の接種券がお手元にある場合は、そちらをお使いください。ワクチンを受けたい医療機関や会場をお探しのうえ、予約をお願いします。

接種券をなくしてしまった場合は、お住まいの市町村にご連絡ください。

ワクチン接種の詳しい情報については、こちらをご覧ください。

1・2回目接種 ▶



オミクロン株対応2価ワクチン接種 ▶



◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

感染予防対策を継続していただくようお願いいたします。



密集場所



密接場面



密閉空間



マスクの着用(※)



石けんによる手洗い



手擦消毒用アルコールによる消毒の励行



こまめな換気

(※) 屋外では、人と会話をするとき以外は、熱中症を防ぐためにもマスクを外しましょう。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



新型コロナワクチンについて 考えましょう!

お子様向け

うちたい
理由は?

自分も
まわりの人も
安心できるから

パパや
ママが
うっているから

おじいちゃん、
おばあちゃんに
会えるから

コロナが早く
終わってほしい、
友だちとずっと
遊びたい



ワクチン
うったほうがいい?
うたなくていい?

うちたくない
理由は?

熱とか
でるのが
こわい

痛いのは
イヤ

子どもは
かんせんしても
すぐなおるから

新型コロナワクチンをなぜ受けるの?

人の体の中に新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、ねつ、だるさ、せき、息苦しき、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、体の調子が悪くなります。

ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができるので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。

ワクチンを受けた後

ワクチンを受けると、以下の症状がでることがありますが、2〜3日で自然と良くなるということがわかっています。

- ねつ ●気持ち悪さ ●だるさ
- おなかをこわす ●頭のいたみ ●さむけ

ワクチンのこと、おうちの人とよくお話ししましょう。

守ってほしい、たいせつなこと

ワクチンを受けたい人も受けたくない人もいます。アレルギーなどで受けられない人もいます。

ワクチンを受けているから、受けていないからといって、周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にやめましょう。



北海道

北海道保健福祉部感染症対策局
感染症対策課(ワクチン班)

一般社団法人 北海道医師会(監修)

イラスト:榎本菜摘(第4回北のまんが大賞 まんが部門 知事賞受賞)

5歳から11歳の方も、
新型コロナワクチン接種を受けられます。

お子様のワクチン接種について 考えましょう!

接種させたい
理由は?

祖父母に
会わせたい、
日常生活を
取り戻したい

子どもに
基礎疾患が
あるので重症化が
心配

感染して
後遺症に
悩んでいる中学生を
知っている

新型コロナワクチン
接種させたほうがいい?
させないほうがいい?

接種させたくない
理由は?

アレルギーが
あるので
副反応が心配

ワクチンの
効果が疑問、
安全性が不安

子どもは
重症化しないので、
大人の都合で
受けさせたくない

不確かな情報に惑わされず、正しい知識でお子様と一緒に考えましょう。

小児への接種は、強制されるものではありません。

ワクチンについての疑問や不安があるときは、かかりつけ医などにご相談ください。

新型コロナワクチンの 効果

新型コロナワクチンを受けることで、
新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。



新型コロナワクチンの 必要性

小児においても中等症や重症例が確認されており、特に基礎疾患を有する等、
重症化するリスクが高い小児には接種の機会を提供することが望ましいとされ
ています。また、今後、新たな変異株が流行することも想定されるため、小児を対
象にワクチン接種をすすめることとされました。

新型コロナワクチンの 副反応

子どもが新型コロナワクチンを受けた後は、注射した部分の痛みが一番多く現
れます。疲れた感じや発熱などは、1回目よりも2回目の後の方が多く現れます。
ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽症又は中等度であり、安全性に重
大な懸念は認められないと判断されています。

子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 子ども

検索

ホームページをご覧にならない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



新型コロナワクチン 専門相談ダイヤルを開設

- ・ ワクチンの副反応等に関する相談
- ・ 副反応発生時の受診に関するアドバイス
- ・ ワクチンの有効性・安全性に関する情報提供

※ 接種の機関や日程等については、市町村にご相談ください。

ワクチン接種相談センター

0 1 2 0 - 3 0 6 - 1 5 4

(FAX : 0 1 1 - 7 9 9 - 0 3 3 8)

【受付時間】9時00分～17時30分(平日、土日・祝日)

5歳から11歳のお子様の保護者の方へ (新型コロナワクチン接種(3回目)のお知らせ)



3



5歳から11歳のお子様も、

回目接種が受けられるようになりました。

Q. なぜ追加接種(3回目接種)が必要なのでしょう?

- A. 子どもの感染者数の増加とともに、重症者数も増加傾向にあります。初回接種(1・2回目接種)後、時間経過とともに発症予防効果が低下しますが、追加接種(3回目接種)を行うことにより効果が回復すると報告されています。ぜひ、お子様と一緒に3回目接種をご検討ください。

接種の対象と使用するワクチン

- 1・2回目接種を完了した5～11歳のお子様を対象です。
- 1・2回目接種を完了し、5か月以上、間隔を空けて接種します。ファイザー社の5～11歳用のワクチンを使用します(※)。(※)ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。



新型コロナワクチンの効果

Q. 3回目接種をすることで、どんな効果がありますか?

- A. 新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。5～11歳の子どもに対するワクチンの追加接種後は、オミクロン株を含む新型コロナウイルスに対する中和抗体価(※)が上昇します。また、時間経過とともに低下した初回接種による発症予防効果が、追加接種により回復すると報告されています。

(※)ウイルスの感染力や毒素の活性を中和できる抗体の値のこと

出典：特許医薬に係る報告書

Flaming-Dutra KZ, Britton A, Shang N, et al. Association of Prior BNT162b2 COVID-19 Vaccination With Symptomatic SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents During Omicron Predominance. JAMA. 2022;327(22):2210-2219.



新型コロナワクチンの安全性

Q. 3回目接種を受けた後は、2回目接種の後と比べてどんな症状が出ますか?

- A. 5～11歳の子どもに対する3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目接種の後と比べると、おおむね同様の症状が見られ、2回目接種時を上回るリスクは報告されていません。

■ 5～11歳の接種後7日間に現れた症状発現率の比較(ファイザー社ワクチンを使用)

報告割合	接種後の症状(2回目接種後→3回目接種後の症状の発現率)		
50%以上	疼痛(72.2→73.9%)		
10～50%	疲労(46.6→45.6%)	頭痛(30.1→34.0%)	筋肉痛(12.5→18.3%)
	発赤(16.5→15.6%)	腫脹(14.0→16.4%)	悪寒(10.3→10.5%)
1～10%	発熱(8.8→6.7%)	関節痛(5.5→6.7%)	下痢(6.5→4.9%)
	嘔吐(1.8→2.4%)		



出典：特許医薬に係る報告書

5～11歳用のワクチンがオミクロン株流行下でも有効であるとの最新情報を踏まえ、5歳から11歳のお子様にはワクチンを受けていただけるよう、ご本人とその保護者の方に努めていただくことになりました。これは、国民の皆さまに接種にご協力いただきたいという趣旨によるものであり、接種を強制するものではありません。詳しくは厚生労働省ホームページQ&Aをご覧ください。→





新型コロナワクチンを受けるには

◎5歳から11歳のお子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についての正しい情報を確認し、お子様とご相談のうえ、保護者の方に接種をご判断いただきますようお願いいたします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。

周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。



◎ワクチンについての疑問があるときはかかりつけ医などにご相談ください。

新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医などにご相談ください。同時または前後2週間は、インフルエンザワクチンを除き、原則として、他のワクチンを受けることはできません。また、お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医などによくご相談ください。

ご相談先など

◎新型コロナワクチンに関するご相談先

ワクチン接種後に、体に異常があるとき

→ ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、市町村や都道府県の窓口

ワクチン接種全般に関するお問い合わせ

→ 市町村の窓口



◎予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます(※)。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

(※)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのように、しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。



密集した場所



密集した場面



密閉された空間



マスクの着用(※)



石けんで手洗い



手指の消毒



こまめな換気

(※)屋外では、人と会話をするとき以外は、熱中症を防ぐためにもマスクを外しましょう。

子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生 コロナ ワクチン 子ども

検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



新型コロナウイルスワクチン接種(3回目)についてのお知らせ

新型コロナウイルスワクチンをなぜ受けるの？

人の体の中に新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、
ねつ、だるさ、せき、息ぐるしさ、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、
体の調子が悪くなります。
ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができる
ので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。



新型コロナウイルスワクチンを受けるときは、どんなことに注意すればいいの？

受ける前

37.5℃以上のねつがあるときや、体の調子が悪いときは、
ワクチンを受けられないので、そのことをおうちの人に伝えましょう。



受ける時

ワクチンは肩の近くに注射します。肩を出しやすい服で、受けに行きましょう。

受けた後

① ワクチンを受けた後、
15分以上はすわって様
子をみましょう。(30分様
子を見る場合もあります)



② 当日はお風呂に入るなど、
いつも通りの生活をする
のは問題ありませんが、激
しい運動はやめましょう。



③ ワクチンを受けると、右のような症状
が出ることがありますが、2～3日で自
然とよくなることがわかっています。

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ☐ ねつ | ☐ さむけ |
| ☐ だるさ | ☐ 気持ちわるさ |
| ☐ 頭のいたみ | ☐ おなかをこわす |



こんな症状が出たら、おうちの人や周りの大人に知らせましょう。

● 受けたすぐ後

- ☐ 体のかゆさ
☐ せき



● 受けた日や4日くらいの間

- ☐ ねつ ☐ 頭のいたみ ☐ 胸のいたみ ☐ 息ぐるしさ
☐ だるさ ☐ さむけ ☐ 胸がドキドキした感じ



1・2回目のワクチンを受けた後、
5か月以上の間をあけて、3回目を受けてください。



守ってほしい、大切なこと。

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由
がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けて
いないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりす
ることは、絶対にしてはいけません。



5歳から11歳のお子様の保護者の方へ (新型コロナワクチン接種(3回目)のお知らせ)



3



5歳から11歳のお子様も、

回目接種が受けられるようになりました。

Q. なぜ追加接種(3回目接種)が必要なのでしょう?

- A. 子どもの感染者数の増加とともに、重症者数も増加傾向にあります。初回接種(1・2回目接種)後、時間経過とともに発症予防効果が低下しますが、追加接種(3回目接種)を行うことにより効果が回復すると報告されています。ぜひ、お子様と一緒に3回目接種をご検討ください。

接種の対象と使用するワクチン

- 1・2回目接種を完了した5～11歳のお子様を対象です。
- 1・2回目接種を完了し、5か月以上、間隔を空けて接種します。ファイザー社の5～11歳用のワクチンを使用します(※)。(※)ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。



新型コロナワクチンの効果

Q. 3回目接種をすることで、どんな効果がありますか?

- A. 新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。5～11歳の子どもに対するワクチンの追加接種後は、オミクロン株を含む新型コロナウイルスに対する中和抗体価(※)が上昇します。また、時間経過とともに低下した初回接種による発症予防効果が、追加接種により回復すると報告されています。

(※)ウイルスの感染力や毒素の活性を中和できる抗体の値のこと

出典：特許医薬に係る報告書

Flaming-Dutra KZ, Britton A, Shang N, et al. Association of Prior BNT162b2 COVID-19 Vaccination With Symptomatic SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents During Omicron Predominance. JAMA. 2022;327(22):2210-2219.



新型コロナワクチンの安全性

Q. 3回目接種を受けた後は、2回目接種の後と比べてどんな症状が出ますか?

- A. 5～11歳の子どもに対する3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目接種の後と比べると、おおむね同様の症状が見られ、2回目接種時を上回るリスクは報告されていません。

■ 5～11歳の接種後7日間に現れた症状発現率の比較(ファイザー社ワクチンを使用)

報告割合	接種後の症状(2回目接種後→3回目接種後の症状の発現率)		
50%以上	疼痛(72.2→73.9%)		
10～50%	疲労(46.6→45.6%)	頭痛(30.1→34.0%)	筋肉痛(12.5→18.3%)
	発赤(16.5→15.6%)	腫脹(14.0→16.4%)	悪寒(10.3→10.5%)
1～10%	発熱(8.8→6.7%)	関節痛(5.5→6.7%)	下痢(6.5→4.9%)
	嘔吐(1.8→2.4%)		

出典：特許医薬に係る報告書



5～11歳用のワクチンがオミクロン株流行下でも有効であるとの最新情報を踏まえ、5歳から11歳のお子様にはワクチンを受けていただけるよう、ご本人とその保護者の方に努めていただくことになりました。これは、国民の皆さまに接種にご協力いただきたいという趣旨によるものであり、接種を強制するものではありません。詳しくは厚生労働省ホームページQ&Aをご覧ください。→





新型コロナワクチンを受けるには

◎5歳から11歳のお子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についての正しい情報を確認し、お子様とご相談のうえ、保護者の方に接種をご判断いただきますようお願いいたします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。

周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。



◎ワクチンについての疑問があるときはかかりつけ医などにご相談ください。

新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医などにご相談ください。同時または前後2週間は、インフルエンザワクチンを除き、原則として、他のワクチンを受けることはできません。また、お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医などによくご相談ください。

ご相談先など

◎新型コロナワクチンに関するご相談先

ワクチン接種後に、体に異常があるとき

→ ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、市町村や都道府県の窓口

ワクチン接種全般に関するお問い合わせ

→ 市町村の窓口



◎予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます(※)。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

(※)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのように、しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。



密集した場所



密集した場面



密閉された空間



マスクの着用(※)



石けんで手洗い



手指の消毒



こまめな換気

(※)屋外では、人と会話をするとき以外は、熱中症を防ぐためにもマスクを外しましょう。

子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生 コロナ ワクチン 子ども

検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

